病治療學

保證實切有用信求務版出

葉勁秋編

********** 來涵 **尿後之疼痛。較排尿時光劇。尿中往往否有血液。** 同時柔軟o而凡受病之部分。俱能預防血後之凝滯o而無刺戟與助長體內生熱作用也 脱之尖端兩鼠逐節之間。〕腫大。有時不便不通此等症狀。 之程度而至細小。甚至自尿道白點觸漏出者刊之。至若尿閉。則有作命之危險也。 尿道狹窄 化膿。則當施以手術 治法自然以安静為第一。陰囊肛門間。應施以冷罨或温罨法。一方通以大便。 既爲溫熱療法○又有殺菌之力。故用後即見充血著明減退。而漸趨於和緩 o 炎症 李全安君 終則尿道內或陰蛭肛門之間。破爛而排出多量之膿汁也。凡惠慢性淋者 凡患本症者其肛門內及會陰均覺疼痛。 本症乃淋疾經過中。因療痕收縮而徐徐發生。排出之尿線。恆相應於狹窄 發攝氏三十八度以上之高熱 攝護線部(在

報識常學醫會社名又

(戊)急病隨請 (丁)膏丸方四元 (乙)門黔一元 (内)出於四元

啓處號掛

從多个維補談到豈 白菜蘿蔔 (湯士彦)

極妙方法一可惜大家都視去清潔腸胃(例如冬令空氣乾清潔腸胃(例如冬令空氣乾

5

心盦詩草

版 亂 品 的 選 也 。 選

郵費在內。 定價三角。實售七折。

筆中国 楊志

J

第

-

心哈哈

荷葉。茆根。

海柳根。

大黄

大吐血。及路血。服此即止

功效)

人参三錢加棗

氣血吐血

一二枚。以水煎濃。

完)

榆之

服此

¥,

(三)還有人說。『瘦弱小兒的慢驚風。也是腦充血嗎。』我說。這是又當一論。語云『過猶不及。』例如與痛一症。在新醫外別。有充血性、及貧血性之分。頭痛既有充血和貧血的兩人。」例如與痛一症。在新醫外別。有充血性、及貧血性之分。頭痛既有充血和貧血的兩人。可以看到青筋暴露。口唇著自。沒有血色。服建發藍。而不銳敏。善於暗哭。這病重要的原因。神是失乳。在西醫叫着『小兒慢性消化不良。』中醫俗稱『脾疳。』只要有了要的原因。神是失乳。在西醫叫着『小兒慢性消化不良。』中醫俗稱『脾疳。』只要有了要的原因。神是失乳。在西醫叫着『小兒慢性消化不良。』中醫俗稱『脾疳。』只要有了要的原因。神是失乳。在西醫叫着『小兒慢性消化不良。』中醫俗稱『脾疳。』只要有了要的原因。神是失乳。在西醫叫者『小兒慢性消化不良。』中醫俗稱『脾疳。』只要有了事主先生。治小兒慢驚。反用為、著、水、桂。就是這個道理。

途離婦指痛疾蟑螂。

法治種各有內書本

監相熟。 合相得取出,於青石臼中。 四君子楊末。知母黃柏木各一兩。共

百石白中。以木槌打 中一兩。共和加入。 東用平胃

與前八殊和

邻服三

四大航特厚一洋全角洋收價別大裝售

發報乘南路三上行館屬路等馬海

療自病百成造

斯四物源 中の量数 雄豬脊髄一條の2

羊脊髓一條。

去骨取肉用

* 如 功 田 和 、 整 國 。 內 教 分 、 雖 及 特 徐 接

四治 擔疾方 (陳孔生) 一切件冷之物。惟以冀湯樂熱 飲之。最良。熱未全退。不宜 遊食。服截瘧之藥。必俟養素 過後。(金鷄納霜丸)截痃最豐 口治 小樂·

口葛可久治吐血 口口吐血與肺器

(6)白瓜膏 食之。與太平九消化九相問服。亦佳。 的已見第六十二期本報

一内容之一 肺癆士效方(場志) 班

取ば・復感情般物質片風観。寒 0 移村出